

提供項目（＊は生成データ）	必ず提供＝○、 必要時提供＝△、 提供しない＝×	内容－選択肢はコンマ区切り、説明は〔 〕内に記載
新規登録日	×	[yyyy/mm/dd]
新規登録者	×	[各施設担当者UMIN-ID]
最終更新日	×	[yyyy/mm/dd]
最終更新者	×	[各施設担当者UMIN-ID]
UMIN登録番号	○	[Exxxxxxxの形式で自動付与]
施設名	○	[入力時自動付与]
研究の選択	○	J-RBR,J-KDR,CRF/CKD,DM,AKI,Biomarker
研究選択番号	△	1,2,3,4,5,6 [JRB=1, JKDR=2, DM=3, CRF/CKD=4, AKI=5, Biomarker=6]
腎生検実施日	△	[yyyy/mm/dd yは自由入力、mとdはプルダウン]
腎生検実施施設	△	[自由記載テキスト]
腎生検実施施設番号	△	[6桁の半角数字または99]
地域番号都道府県別＊	△	[腎生検実施施設番号/10000整数]
地域別＊	△	[地域番号都道府県別 1=北海道、2-7=東北、8-14=関東、15+19-20=甲信越、16-18=北陸、21-24=東海、25-30=関西、31-35=中国、36-39=四国、40-47=九州・沖縄]
症例登録番号	△	[各施設独自の整理番号（文字列）]
【臨床診断】腎組織種類	○	自己腎,プロトコール（生体腎）,エピソード（生体腎）,プロトコール（献腎）,エピソード（献腎）
【臨床診断】尿異常	○	血尿のみ,蛋白尿のみ,血尿・蛋白尿,なし,不明
【臨床診断】急性腎炎症候群	○	あり,なし,不明
【臨床診断】慢性腎炎症候群	○	あり,なし,不明
【臨床診断】急速進行性糸球体腎炎	○	あり,なし,不明
【臨床診断】ネフローゼ症候群	○	あり,なし,不明
【臨床診断】急性腎障害(AKI)	○	あり,なし,不明
【臨床診断】慢性腎機能障害	○	あり,なし,不明
【臨床診断】その他	○	[自由記載テキスト]
【腎生検】生検回数	○	初回,2回目,3回目以上,不明,未実施
【腎生検】生検回数（3回目以上）	○	[3回目以上の回数の数値入力]
【腎生検】生検回数（備考）	○	[自由記載テキスト]
【最終診断】主病名	○	[大分類22項目/小分類]
【最終診断】主病名_大分類＊	△	[/の前を抽出]
【最終診断】主病名_小分類＊	△	[/の後を抽出]
【最終診断】副病名	○	[大分類22項目/小分類]
【最終診断】副病名_大分類＊	△	[/の前を抽出]
【最終診断】副病名_小分類＊	△	[/の後を抽出]
【最終診断】備考	○	[自由記載テキスト]
【詳細分類】IgA腎症：Oxford（M）	△	0,1,分類不能
【詳細分類】IgA腎症：Oxford（E）	△	0,1,分類不能
【詳細分類】IgA腎症：Oxford（S）	△	0,1,分類不能
【詳細分類】IgA腎症：Oxford（T）	△	0,1,2,分類不能
【詳細分類】IgA腎症：Oxford（C）	△	0,1,2,分類不能
【詳細分類】IgA腎症：Japanese（Grade）	△	I,II,III,IV,分類不能
【詳細分類】IgA腎症：Japanese（A/C）	△	A,C,A/C,分類不能
【詳細分類】FSGS：Colombia（Variant）	△	collapsing,tip,cellular,perihilar,NOS,分類不能
【詳細分類】ANCA関連腎炎：MPO-ANCA	△	陽性,陰性,不明
【詳細分類】ANCA関連腎炎：PR3-ANCA	△	陽性,陰性,不明
【詳細分類】ANCA関連腎炎：その他のANCA	△	陽性,陰性,不明
【詳細分類】ANCA関連腎炎：EUVAS分類	△	Sclerotic,Focal,Crescentic,Mixed,不明
【詳細分類】ANCA関連腎炎：腎限局型	△	はい,いいえ,不明
【詳細分類】ANCA関連腎炎：肺病変	△	あり,なし,不明
【詳細分類】ANCA関連腎炎：抗GBM抗体	△	陽性,陰性,不明
【詳細分類】IgA血管炎：ISKDC分類	△	I,II,IIIa,IIIb,IVa,IVb,Va,Vb,VI
【詳細分類】ループス腎炎：ISN/RPS（型）	△	I,II,III,III+V,IV-S,IV-G,IV-S+V,IV-G+V,V,VI,分類不能
【詳細分類】ループス腎炎：ISN/RPS（活動性）	△	A,C,A/C
【詳細分類】糖尿病性腎症	△	結節あり,結節なし,結節不明
【詳細分類】備考	△	[自由記載テキスト]
【臨床情報】年齢	○	[無加工]
年齢層別＊	△	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 [0:0-9歳, 1:10-19歳, 2:20-29歳, 3:30-39歳, 4:40-49歳, 5:50-59歳, 6:60-69歳, 7:70-79歳, 8:80-89歳, 9:90歳以上]
【臨床情報】性別	○	男,女
【臨床情報】身長(cm)	○	[20以上250未満]
【臨床情報】体重（kg）	○	[0.25以上250未満]
BMI＊	△	[小数点下2桁]
【臨床情報】免疫抑制治療（初発）	○	未治療,治療中,治療終了後,その他
【臨床情報】免疫抑制治療（再発）	○	未治療または治療強化前,治療中,治療終了後,その他
【臨床情報】尿蛋白定性	○	(-),(±),(1+),(2+),(3+),(4+)
【臨床情報】尿蛋白定量（g/日）	○	[50未満]
尿蛋白定量（g/日）_層別化＊	△	[1= <0.15, 2=0.15-0.49, 3=0.50-0.99, 4=1.0-3.49, 5=3.5+]

提供項目（＊は生成データ）	必ず提供＝○、 必要時提供＝△、 提供しない＝×	内容－選択肢はコンマ区切り、説明は〔 〕内に記載
【臨床情報】尿蛋白/クレアチニン比	○	[50未満]
尿蛋白/クレアチニン比_層別化＊	△	[1= <0.15, 2=0.15-0.49, 3=0.50-0.99, 4=1.0-3.49, 5=3.5+]
CGA分類Astages＊	△	A1,A2,A3〔「【臨床情報】尿蛋白定量（g/日）」、なければ「【臨床情報】尿蛋白/クレアチニン比」に基づいて〕
【臨床情報】尿潜血定性	○	(-),(±),(1+),(2+),(3+)
【臨床情報】赤血球/HPF	○	0-4, 5-9, 10-29, 30-49, 50-99,100以上〔注意：「100以上」以外の選択肢データには前にタブ記号が入っています〕
【臨床情報】血清クレアチニン（mg/dl）	○	[0.1以上40未満]
eGFR（18歳以上）＊	△	[日本人向け194式#1に基づく。18歳以上のみ算出。小数点下2桁。500未満]
eGFR（小児）＊	△	[日本人小児のref sCr 5次式#2を利用したeGFR#3。2歳～18歳のみ算出。小数点下2桁。500未満]
eGFR（まとめ）＊	△	[上記2つのまとめ、18歳は194式優先。小数点下2桁。500未満]
CGA分類Gstages＊	△	G1,G2,G3a,G3b,G4,G5〔「eGFR（まとめ）」から判定〕
CGAヒートマップ色＊	△	緑,黄,橙,赤〔「CGA分類Astages」「CGA分類Gstages」から当てはめ〕
【臨床情報】血清総蛋白（g/dl）	○	[0.1以上20未満]
【臨床情報】血清アルブミン（g/dl）	○	[0.1以上10未満]
【臨床情報】血清コレステロール（mg/dl）	○	[10以上999未満]
【臨床情報】血清CRP（mg/dl）	○	[50未満]
【臨床情報】糖尿病診断	○	無,I型,II型,その他の糖尿病,不明
【臨床情報】HbA1c(NGSP)	○	[0.1以上30未満]
【臨床情報】収縮期血圧	○	[50以上300未満]
【臨床情報】拡張期血圧	○	[30以上200未満]
【臨床情報】降圧薬	○	有,無,不明
【臨床情報】B型肝炎	○	有,無,不明
【臨床情報】C型肝炎	○	有,無,不明
【臨床情報】HIV	○	有,無,不明
【臨床情報】備考	○	[自由記載テキスト]
【臨床情報】調査個人票の記載	△	有,無
【臨床情報】調査個人票の記載;有の場合	△	アップロードを行う,アップロードは行わない
【臨床情報】本フォームの登録	×	登録する,一時保存,登録しない
【臨床情報】自由記載	○	[自由記載テキスト]

#1: 194×sCr-1.094×Age-0.287（女性の場合×0.739）（sCr:血清クレアチニン[mg/dL]、Age:年齢[歳]）

#2: 男児ref sCr=-1.259×Ht5+7.815×Ht4-18.57×Ht3+21.39×Ht2-11.71×Ht+2.628

女児ref sCr=-4.536×Ht5+27.16×Ht4-63.47×Ht3+72.43×Ht2-40.06×Ht+8.778（Ht:身長[m]）

#3: 110.2×(ref sCr/sCr)+2.93